

**ANNEXE 2 – TABLEAU DES PHENOTYPES FONCTIONNELS DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE**

| <b>TABLEAU DES PHENOTYPES FONCTIONNELS</b> |                            |  |  |  |   |
|--|----------------------------|--|--|--|---|
| <b>Fonctions</b>                           |                            | <b>Aucune limitation</b>   | <b>Limitation minime</b>   | <b>Limitation modérée</b>  | <b>Limitation sévère</b>  |
| <b>Fonctions locomotrices</b>              | Fonction musculaire neuro  | Normale  | Altération minime de la motricité et du tonus  | Altération de la motricité et du tonus lors de mouvements simples                                      | Altération de la motricité et du tonus affectant la gestuelle et l'activité au quotidien              |
|  | Fonction articulaire ostéo | Normale  | Altération au max de 3/5 d'amplitude, sur une ou plusieurs articulations sans altération des mouvements complexes  | Altération à plus de 3/5 d'amplitude sur plusieurs articulations avec altération de mouvements simples | Altération d'amplitude sur plusieurs articulations, affectant la gestuelle et l'activité au quotidien |
|  | Endurance à l'effort       | Pas ou peu de fatigue  | Fatigue rapide après une activité physique intense   | Fatigue rapide après une activité physique modérée   | Fatigue invalidante dès le moindre mouvement  |
|  | Force                      | Force normale  | Baisse de force, mais peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires                                | Ne peut vaincre la résistance pour un groupe musculaire  | Ne peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires                                      |
|  | Marche                     | Distance théorique normale couverte en 6mn = $218 + (5,14 \times \text{taille en cm}) - (5,32 \times \text{âge en années}) - (1,80 \times \text{poids en kg}) + (51,31 \times \text{sexe})$ , avec sexe=0 pour les femmes, sexe=1 pour les hommes. | Valeurs comprises entre la distance théorique et la limite inférieure de la normale (82% de la distance théorique) | Valeurs inférieures à la limite inférieure de la normale   | Distance parcourue inférieure à 150 m.  |

**ANNEXE 2 – TABLEAU DES PHENOTYPES FONCTIONNELS DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE**

|   |                           |   |  |  |   |
|---|---------------------------|---|--|--|---|
| <b>Fonctions cérébrales</b>             | Fonctions cognitives      | Bonne stratégie, vitesse normale, bon résultat              | Bonne stratégie, lenteur, adaptation possible, bon résultat                                    | Mauvaise stratégie de base, adaptation, résultat satisfaisant ou inversement bonne stratégie de base qui n'aboutit pas | Mauvaise stratégie pour un mauvais résultat, échec  |
|   | Fonctions langagières     | Aucune altération de la compréhension ou de l'expression    | Altération de la compréhension ou de l'expression lors d'activités en groupe                   | Altération de la compréhension ou de l'expression lors d'activités en individuel                                       | Empêche toute compréhension ou expression   |
|   | Anxiété/Dépression        | Ne présente aucun critère d'anxiété et/ou de dépression     | Arrive à gérer les manifestations d'anxiété et/ou de dépression                                | Se laisse déborder par certaines manifestations d'anxiété et/ou de dépression  | Présente des manifestations sévères d'anxiété et/ou de dépression   |
| <b>Fonctions sensorielles + douleur</b> | Capacité visuelle         | Vision des petits détails à proche ou longue distance       | Vision perturbant la lecture et l'écriture mais circulation dans l'environnement non perturbée | Vision ne permettant pas la lecture et l'écriture / circulation possible dans un environnement non familial            | Vision ne permettant pas la lecture ni l'écriture. Circulation seul impossible dans un environnement non familial |
|   | Capacité sensitive        | Stimulations sensibles perçues et localisées                | Stimulations sensibles perçues mais mal localisées   | Stimulations sensibles perçues mais non localisées   | Stimulations sensibles non perçues, non localisées.   |
|   | Capacité auditive         | Pas de perte auditive.                                      | La personne fait répéter.  | Surdité moyenne. La personne comprend si l'interlocuteur élève la voix   | Surdité profonde  |
|   | Capacités proprioceptives | Equilibre respecté  | Déséquilibre avec rééquilibrages rapides   | Déséquilibres mal compensés avec rééquilibrages difficiles   | Déséquilibres sans rééquilibrage Chutes fréquentes lors des activités au quotidien                                |
|   | Douleur                   | Absence de douleur en dehors d'activités physiques intenses | Douleur à l'activité physique/ Indolence à l'arrêt de l'activité                               | Douleur à l'activité physique et qui se poursuit à distance de l'activité  | Douleur constante avec ou sans activité   |